

Reconstrucción de la base de cráneo anterior

Es fundamental para evitar la [fístula de líquido cefalorraquídeo](#) ya que su existencia es responsable de una [meningitis](#) en un tercio de los pacientes.

Etiología

Patología congénita

Tumores

Traumatismo

Objetivos

Cierre del defecto de la [duramadre](#) con el fin de prevenir la fístula de líquido cefalorraquídeo.

Cobertura del defecto con tejido bien vascularizado.

Reconstrucción de las paredes faríngeas

Obliteración del [seno paranasal](#)

Prevención del [encefalocele](#) ¹⁾.

Métodos

Sellante de fibrina

flap pericraneal

¹⁾

Sekhar L N, Schramm V L, Jr, Jones N F. In: Sekhar LN, Schramm VL Jr, editor. Tumors of the Cranial Base: Diagnosis and Treatment. Mount Kisco, NY: Futura; 1987. Operative management of large neoplasms of the lateral and posterior cranial base.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=reconstruccion_de_la_base_de_craneo_anterior

Last update: 2025/05/04 00:03

