

La falta de memoria es una de las quejas más importantes de los pacientes con [epilepsia](#).

En un estudio publicado en Neurology sobre 230 pacientes con esclerosis hipocámpal:

El lóbulo temporal izquierdo, normalmente asociado con la memoria de números y palabras, estaba implicado en la pérdida de memoria de 132 pacientes. Mientras que el lóbulo temporal derecho, relacionado con memoria de caras, lugares e imágenes, estuvo implicado en 105 de los pacientes.

El 22% de los pacientes con cirugía en el lóbulo temporal derecho y el 9% de los que la recibieron en el lóbulo temporal izquierdo mostraron mejorías en la memoria tras la lobectomía temporal parcial. En aquellas personas en las que la duración de la epilepsia era menor, su mejoría era mayor.

Sin embargo, hubo pacientes en los que se observó una reducción de la memoria después de realizar la cirugía. Esta disminución post-quirúrgica de la memoria, aunque pueda recuperarse después de algunos meses, también puede ser duradera. Esta disminución es debida a que se pierde la capacidad de retener recuerdos nuevos y no a la pérdida de recuerdos específicos (Baxendale y col., 2008).

Bibliografía

Baxendale, Sallie, Pamela J. Thompson, and John S. Duncan. 2008. "Improvements in Memory Function Following Anterior Temporal Lobe Resection for Epilepsy." Neurology 71 (17) (October 21): 1319 -1325. doi:10.1212/01.wnl.0000319699.04265.fd.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=reseccion_del_lobulo_temporal_anterior

Last update: 2025/05/04 00:02

