

Revised Trauma Score

La Revised Trauma Score (RTS) es un sistema de puntuación fisiológica, diseñado para su uso en base a los signos vitales iniciales de un paciente.

Una puntuación más baja indica una mayor gravedad de la lesión.

La Revised Trauma Score se compone de tres categorías: [Glasgow Coma Scale](#), la presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria.

El rango de puntuación es de 0 a 12.

En triage START, un paciente con una puntuación de 12 RTS se etiqueta retardada, 11 es urgente y 10-3 es inmediata.

Los que tienen un RTS por debajo de 3 son declarados muertos y no deben recibir cierta atención debido a que son muy pocas probabilidades de sobrevivir sin una cantidad significativa de recursos.

Champion HR, Sacco WJ, Carnazzo AJ, Copes W, Fouty WJ (September 1981). "Trauma score". Crit. Care Med. 9 (9): 672-6. PMID 7273818.

Jump up ^ Taber, Clarence Wilbur; Venes, Donald (2009). Taber's cyclopedic medical dictionary. F a Davis Co. p. 2366. ISBN 0-8036-1559-0.

Jump up ^ Champion HR, Sacco WJ, Copes WS, Gann DS, Gennarelli TA, Flanagan ME (May 1989). "A revision of the Trauma Score". The Journal of Trauma 29 (5): 623-9. PMID 2657085.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=revised_trauma_score

Last update: **2025/05/03 23:57**

