

Los schwannomas del nervio facial (SNF) son lesiones benignas, de crecimiento lento y predecible, generalmente asintomáticas, son los terceros más frecuentes tras el [schwannoma del nervio vestibular](#), y [trigeminal](#).

Se pueden encontrar en cualquier sitio del recorrido del nervio facial, ya sea en su emergencia a nivel del tronco encefálico en su porción intracraneana en fosa media, en su trayecto intrapetroso a nivel del hueso temporal y extratemporal a nivel de la glándula parótida.

Los más frecuentes son los que afectan la porción intratemporal del nervio facial

Sólo el 9% de los casos de SNF se presenta sobre la porción intraparotídea.

Los tumores atípicos del nervio facial deben distinguirse de la schwannoma del nervio facial.

Se sabe poco sobre las lesiones raras, y por lo tanto puede estar justificado un enfoque conservador, como el papel de la radiocirugía, la descompresión del nervio facial, y las indicaciones de resección del tumor y anastomosis.

Ross L, Drazin D, Eboli P, Lekovic GP. Atypical tumors of the facial nerve: case series and review of the literature. Neurosurg Focus. 2013 Mar;34(3):E2. doi: 10.3171/2013.1.FOCUS12380. PubMed PMID: 23452290.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=schwannoma_del_nervio_facial

Last update: **2025/05/03 23:59**

