

Seno esfenopetroso

Conducto venoso que nace del seno sagital superior y desciende por el borde posterior del ala menor del esfenoides hasta el seno cavernoso.

Afluentes:

Recibe venas meníngeas, a las venas diploicas, a la rama frontal de la vena meníngea media y a la vena cerebral media superficial.

Estas dos últimas también pueden drenar en el seno cavernoso.

Terminación:

Desemboca en el extremo anterior del seno cavernoso.

Cuando este seno sale del cráneo para unirse a la vena emisaria esfenoidal y al plexo pterigoideo es denominado seno esfenobasal.

Cuando se dirige posteriormente por la fosa craneal media y drena en el seno petroso superior o en el seno transversal se le llama **seno esfenopetroso**.

Las variaciones del seno cambian la desembocadura de la vena cerebral media superficial, que habitualmente drena en el seno esfenoparietal; si este seno no existe o se encuentra poco desarrollado, la vena puede drenar directamente en el seno cavernoso o bien dirigirse hacia el borde inferior del lóbulo temporal y drenar en el seno esfenobasal o esfenopetroso.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=seno_esfenopetroso

Last update: **2025/05/03 23:59**

