

La existencia de dos articulaciones separadas en el mismo lado es una rara anomalía congénita de la columna vertebral.

Debido a su rareza, esta anomalía tiene un alto potencial de interpretación radiográfica y clínica equivocada. Además, puede estar asociada con otras anomalías óseas que incluyen la ausencia congénita o hipoplasia del pedículo.

Aunque muchas anomalías congénitas pueden ser diagnosticadas por radiografía simple, otros estudios de imagen y, especialmente la tomografía computarizada y la resonancia magnética se debe realizar con el fin de evaluar con precisión los hallazgos radiológicos y para planificar la operación (Kutlay y col., 2011).

## Bibliografía

Kutlay, Murat, Berker Cemil, Kivanc Topuz, Mehmet Nusret Demircan, and Zafer Kucukodaci. 2011. "Existence of Two Separate Facet Joints on the Same Side: Case of a Congenital Anomaly." Turkish Neurosurgery 21 (2): 239-241. doi:10.5137/1019-5149.JTN.2758-09.0.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN  
1988-2661**



Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=separacion\\_articular](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=separacion_articular)

Last update: **2025/05/03 23:58**