Spongostan

Hemostático tópico absorbible.

Actua como efecto fisico.

Provee absorcion, barrera al flujo sanguineo y una matriz para la formacion de coágulo.

Esta indicado para asistir en procedimientos quirúrgicos en el control de la sangrado de venas capilares y sangrado en capas cuando el uso de ligaduras u otros metodos convencionales es dificil o inefectivo. Perfil de absorcion: Se absorbe en 4 a 6 semanas, y 2-5 dias en contacto con la mucosa o con la piel.

Facilita la craneoplastia posterior tras una craniectomía descompresiva, al prevenir adherencias entre contenidos intracraneales, la galea aponeurótica y fascia del músculo temporal, ya que la disección es más rápida y potencialmente más segura, lo que puede mejorar los resultados clínicos.

Las indicaciones deben ampliarse para incluir la colocación en el espacio epidural después de una craneotomía [1)].

1)
Oladunjoye, Azeem O, Rudolph J Schrot, Marike Zwienenberg-Lee, J Paul Muizelaar, and Kiarash Shahlaie. 2013. “Decompressive Craniectomy Using Gelatin Film and Future Bone Flap Replacement.” Journal of Neurosurgery (February 8). doi:10.3171/2013.1.JNS121475

From:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/ - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:
https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=spongostan

Last update: **2025/05/03 23:57**