

Teratoma intramedular

El teratoma espinal es un tumor raro de la médula espinal que se encuentran con frecuencia en los niños.

Aunque el mecanismo de base para la formación de estos tumores no está claro, existen varias líneas de evidencia sobre un proceso disembriogénico en la formación del embrión.

Se ha descrito en un paciente de 18 años, previamente sano (Kalani y col., 2012).

Teratomas sacrocoxígeos

Teratomas de filum

Histológicamente esta compuesto por tejido adiposo, fibroso, queratinoso.

La tomografía computarizada distingue la grasa y el tejido circundante sólido del líquido cefalorraquídeo, pero no diferencia el componente de queratina de la masa.

La Resonancia magnética demuestra adecuadamente los tres componentes principales del tumor (Monajati y col., 1986).

Bibliografía

Kalani, M Yashar S, Sudarshan Iyer, Stephen W Coons, and Kris A Smith. 2012. "Spinal Intradural Teratomas: Developmental Programs Gone Awry?" Neurosurgical Focus 33 (4) (October): E1. doi:10.3171/2012.8.FOCUS12230.

Monajati, A, R M Spitzer, J L Wiley, and L Heggeness. 1986. "MR Imaging of a Spinal Teratoma." Journal of Computer Assisted Tomography 10 (2) (April): 307-310.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=teratoma_intramedular

Last update: 2025/05/04 00:02

