

Tercer nervio occipital

Es rama directa del ramo dorsal de la raíz C3 e inerva la piel de la [nuca](#) en la zona de la línea media.

La rama ventral del C3 se une al plexo cervical e inerva los músculos prevertebrales

La rama dorsal inerva varios músculos del cuello posterior.

Su rama lateral se distribuye al esplenio de la cabeza y cervical, y para el capitis longissimus .

Sus ramas profundas al semiespinoso cervicis y multifidus . Su rama medial superficial, conocido como el tercer nervio occipital , suministra los semispinalis capitis y se convierte cutánea sobre la región suboccipital . Inmediatamente después de su origen los terceros curvas nervio occipital alrededor de los aspectos laterales y posterior de la C2 - 3 zigoapofisarias conjunta . A su paso por esta articulación que está incrustado en el fascia que rodea la cápsula articular y los suministros articulares ramas a la articulación [10] . El nervio sinuvertebral de C3 , como los de C1 y C2, inerva los ligamentos atlantoaxoideas y la duramadre de la médula espinal y clivus . Sin embargo, este nervio también inerva el disco intervertebral C2 - 3 a partir de su cara posterior [17] . Otras ramas al vástago del disco de la rama ventral del C3 . Estos incluyen las ramas del nervio vertebral en C3 y ramas de los nervios de los músculos prevertebral [17].

http://download.springer.com/static/pdf/379/art%253A10.1007%252Fs11916-001-0029-7.pdf?auth66=1387717497_8587d30ec1c2fdaf2701012864b6d046&ext=.pdf

Radiofrecuencia

La [radiofrecuencia](#), se realiza en [decúbito supino](#)..

Localización radioscópica de articulación facetaria C2-C3.

Se realiza 1 mm por encima y por debajo de articulación C2-C3.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=tercer_nervio_occipital

Last update: **2025/05/03 23:56**

