

Tumor frontal clínica

La **cefalea** es uno de los **síntomas** más frecuentes, pero los trastornos en la esfera mental caracterizan esta localización mucho antes que los síntomas de **hipertensión intracraneal**, aun cuando estos tumores hayan alcanzado grandes dimensiones; ocurren alteraciones de la personalidad con desórdenes de tipo psiquiátrico, rápidamente el paciente entra en un estado de **depresión**, o puede presentar síntomas de **demencia** progresiva que en los ancianos puede catalogarse como una demencia senil evolutiva de otra causa.

La capacidad intelectual suele ser la más afectada, se pierde la capacidad de autocrítica y la **moria** es frecuente, estos trastornos son generalmente de progresión rápida, y la anamnesis tiene gran importancia para el diagnóstico clínico.

Las **convulsiones** pueden presentarse hasta en un 50% de los casos con trastorno del lenguaje que se traduce en sentir deseos de hablar sin poder hacerlo.

La **afasia** de expresión ocurre cuando el tumor afecta la parte posterior de la circunvolución frontal anterior.

La compresión de las fibras piramidales puede producir **hemiparesia** contralateral, preferentemente a predominio facio- braquial.

ver **parálisis facial**.

La compresión del nervio olfatorio produce anosmia del lado del tumor: si comprime el nervio óptico de un lado produce atrofia óptica en éste y edema papilar en el otro lado (**síndrome de Foster Kennedy**), el paciente también puede presentar **ataxia** de tipo frontal.

Mareo.

Alteraciones en el lenguaje.

Alteraciones de la **memoria**.

Alteraciones de la personalidad.

Pérdida de olfato.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=tumor_frontal_clinica

Last update: 2025/05/03 23:58

