

VECURONIO

- PRINCIPIO ACTIVO: Bromuro de Vecuronio
- Nombre comercial: NORCURON.
- PRINCIPALES INDICACIONES: Relajante muscular, utilizado para la intubación endotraqueal (en cirugía y/o ventilación mecánica) · PRESENTACIÓN: Vial en polvo con 10 mg, para diluir en 10 ml SF, SG 5% ó RL. · DOSIFICACIÓN

Dosis inicial: 0,08 - 0,1 mg / Kg bolo IV

(Paciente 70 Kg: 5,6 mg - 7 mg = 5,6 ml - 7 ml)

Dosis de mantenimiento: 0,02 - 0,03mg / Kg bolo IV (a los 25 - 40 minutos de la dosis inicial)

A los 2 minutos de su administración, se consiguen las condiciones idóneas para la intubación, manteniéndose su efecto de 40 - 50 minutos. · PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

- Contraindicado en:
- Miastenia gravis
- Insuficiencia renal
- Obesidad (poner dosis menores)
- Efectos secundarios:
- Bradicardia o taquicardia
- HTA o Hipotensión arterial.
- Arritmias
- Depresión respiratoria.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=vecuronio>

Last update: **2025/05/04 00:00**

