

Warfarina

Anticoagulante oral que se usa para prevenir la formación de trombos y émbolos.

Inhibe la producción de factores de coagulación dependientes de la **vitamina K** y así reduce la capacidad de la sangre de coagular.

Su método de acción más lenta hace que generalmente se requiera más de un día para notar su efecto después de primera dosis.

Hay algunos riesgos asociados con terapia con warfarina, incluyendo sangrado excesivo, interacciones con otros fármacos, y malformaciones congénitas, así que los pacientes que la toman deben ser vigilados con cuidado por sus médicos.

Se pueden dar altas dosis de vitamina K para contrarrestar los efectos de la warfarina, aunque a menudo inhibición completa no ocurre hasta 12-24 horas tras la administración.

La warfarina se deriva de la micotoxina anticoagulante natural dicumarol, que se encuentra en el trébol dulce putrefacto y que causa la muerte por sangrado excesivo de los animales que comen la planta.

Tiene características indeseables, por lo que existe un anticoagulante más nuevo

véase: **Dabigatrán**

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=warfarina>

Last update: **2025/05/03 23:57**

