

Enfermedad actual

Paciente de sexo Masculino de 59 años que ingresa de forma programada para extracción de material de osteosíntesis. Intervenido en 2015 de artrodesis L5-S1, por radiculopatía L5 izq. En seguimiento por UDO por radiculopatía, se realiza bloqueo caudal con rx abordaje trans-hiata sacro con al ropi 0.2% + trigon + c. morfico 0.15 mg tras contraste que pasa con dificultad, sin mejoría. Por lo que se decide EMO.

Exploración física

BEG. NC. NH. Eupneica. sin uso de musculatura accesoria respirando aire ambiente

AC ritmica sin soplos audibles

AP mvc sin otros ruidos asociados.

Abdomen no doloroso, sin signos de irritación peritoneal.

MER - , dolora a la palpación de apofisis transversas lumbares bajas. ROT ++/++++ rotuliano bilateral, no atrofia, cierto grado de disminución de fuerza en dorsiflexion derecha, marcha posible pero muy limitada por dolor.

Evolución

Durante su estancia en la planta el paciente evoluciona de forma favorable. Presenta dolor bien controlado con analgesia. No presenta focalidad neurológica de nueva aparición. Deambula por la planta sin incidencias. No ha presentado TVP ni otras complicaciones postquirúrgicas. Herida seca y sin acúmulos, con buen aspecto.

Dada la buena evolución clínica del paciente se decide alta y control en consultas externas de Neurocirugía.

Tratamiento

- Continuar con medicación igual que previa al ingreso.
- En caso de dolor, analgesia habitual.
- Hibor 2500 UI cada 24 horas sc.
- Cura diaria de la herida con betadine

Recomendaciones

Recuerde que tiene usted la/s siguiente/s cita/s:
El Viernes 30 de Noviembre de 2018 a las 10:30:

Motivo de ingreso

Hombre de 43 años de edad que ingresa por TRASLADO OTRO HOSPITAL procedente de OTRO CENTRO HOSPITALARIO